



Monumento Nacional
Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo



Sitio Ramsar
Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter

Informe Monitoreo Avifauna
JULIO 2018

Oficina Provincial Valdivia



CHILE LO
HACEMOS
TODOS





CHILE LO
HACEMOS
TODOS



CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Región de Los Ríos
Oficina Provincial Valdivia



CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES
(Ramsar, Iran, 1971)

Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo
Sitio Ramsar Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter

Equipo Santuario de la Naturaleza:

GP. Sr. Luis Miranda Herrera
GP. Sr. Roberto Rosas Mena
GP. Sr. Luis Thon Jara
GP. Sr. Mario Maturana Arévalo

(Se permite el uso de la información sin fines comerciales mencionando la fuente de origen).

Índice

1. Resumen	3
2. Introducción	4
3. Metodología	5
4. Resultados	7
4.1 Cisne cuello negro	7
4.1.1 Dentro del Santuario	7
4.1.2 Fuera del Santuario	8
4.1.3 Dentro y fuera del Santuario	8
4.2 Taguas	9
4.3 Huala	9
4.4 Picurio	10
4.5 Pimpollo	10
4.6 Garza boyera	11
4.7 Garza chica	11
4.8 Garza cuca	12
4.9 Garza grande	12
4.10 Cormorán, yeco	13
4.11 Bandurria	13
4.12 Zarapito	14
4.13 Gaviota cáhuil	14
4.14 Gaviotín piquerito	15
4.15 Trile	15
4.16 Siete colores	16
4.17 Pato anteojillo	16
4.18 Pato jergón	17
4.19 Pato negro	17
4.20 Pato real	18
4.21 Pelícano	18
4.22 Traro	19
4.23 Tiuque	19
4.24 Queltehue	20
5 Anexos	
5.1 Resultados del censo al interior del SN (julio 2018)	21
5.2 Valores de abundancia dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza (SN) período noviembre 2002 – julio 2018.	22
5.3 Abundancia mensual y promedio anual de cisne de cuello negro en el SN enero 2000 – julio 2018.	26

1. Resumen

Se entregan los resultados del censo de avifauna realizado en el área bajo protección oficial del Estado de Chile Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo – Sitio Ramsar Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter (SN) correspondientes al mes de julio 2018.

La riqueza de especies al interior del Santuario fue de 19, sumando un total de 19.199 aves registradas, de las cuales un 49,6% corresponden a cisnes de cuello negro (9.526).

La totalidad de cisnes contabilizados dentro y fuera del SN fue de 10.101 ejemplares (Anexo 5.2).

El censo interno de cisnes registró 9.526 ejemplares, (Anexo 5.1), de los cuales 99,7% corresponde a individuos adultos (9.502) y un 0,3% a juveniles (24). La mayoría de los cisnes de cuello negro se localizan en los sectores de Puerto Claro (2.540), Santa María (2.400) e Isla Teja (1.000).

En el censo externo realizado en áreas aledañas al Santuario de la Naturaleza, se contabilizaron 575 ejemplares de cisne de cuello negro, observándose la mayor concentración en el sector de Pichoy (250).

2. Introducción

Inserto en el humedal del río Cruces, se encuentra el área bajo protección oficial del Estado de Chile denominada Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo (SN), creado por D.S. N° 2.734 del 3 de junio de 1981. Por estar bajo la categoría de protección que se incluye en la Ley 17.288¹ no se permite la extracción de recursos naturales.

Abarca una superficie² de 4.892,22 ha, ubicado en las comunas de Mariquina y Valdivia, región de Los Ríos, sur de Chile (mapa 1). El origen del humedal está en el descenso de los terrenos aledaños a los cursos de agua y su posterior inundación como consecuencia del terremoto de mayo de 1960 que afectó al sur de Chile. El SN es importante por la biodiversidad que contiene, más de 20 especies de mamíferos y 119 de aves, la protección que otorga a especies con problemas de conservación (*Lontra provocax*, *Cygnus melancoryphus*), su paisaje y el vínculo histórico de la comunidad con su humedal.

El 27 de julio de 1981 el Santuario se convirtió en el primer Sitio Ramsar de Chile al ser inscrito en la *Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas*, inscribiéndose como Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. La extensión territorial del sitio incluye el lecho del río, bañados, bosques pantanosos y humedales palustres.

El presente informe tiene por propósito difundir las estadísticas del monitoreo permanente que la Corporación Nacional Forestal, CONAF, realiza en el Santuario, utilizando censos para su conteo, correspondientes al mes de julio de 2018. Esta información es recabada mensualmente por los guardaparques del Santuario. Las estadísticas para un conjunto de aves del Santuario (Humedal del Río Cruces) se entregan en los anexos y para grupos selectos de aves se presentan gráficos desde enero de 1999 a la fecha. La metodología empleada se basa en conteos visuales en movimiento (vía acuática mediante lanchas y vía terrestre en vehículo para acceder a puntos

¹ Ley 17.288 de 1970 Legisla sobre Monumentos Nacionales.

² Decreto N° 41, 16/12/2015, Ministerio del Medio Ambiente.

de observación fuera del Santuario) y estaciones terrestres ubicadas en posiciones estratégicas para el avistamiento de aves dentro del humedal.

3. Metodología

Los conteos (censos) periódicos de la avifauna al interior del SN - Humedal del Río Cruces se realizan periódicamente en base a dos métodos:

a) Una es la utilización de estaciones de punto fijo en altura los cuales permiten contabilizar las especies de mayor tamaño (cisne de cuello negro *Cygnus melancoryphus*, pato yeco *Phalacrocorax brasilianus*, taguas *Fulica sp*, entre otras).


b) La otra metodología es la de conteos desde una embarcación con *tracks* (recorridos) de navegación determinados. Este método permite determinar el número de individuos de las especies de menor tamaño y menor abundancia poblacional (pimpollo *Rollandia rolland*, picurio *Podilymbus podiceps*, garza cuca *Ardea cocoi*, garza grande *Casmerodius albus*, garza chica *Egretta thula*, águila pescadora *Pandion haliaetus*, entre otras), así como también contabilizar la presencia de aquellas especies de mayor abundancia pero que, por las condiciones geográficas del lugar dificultan el registro de las estaciones fijas. Estos recorridos se realizan sistemáticamente en lancha a una velocidad adecuada para no generar la movilidad de las aves hacia otras áreas del Santuario. La metodología descrita para el caso de los cisnes se viene realizando desde 1982, pero con mejoras sustanciales desde 1987, mientras que para el resto de las aves esto ocurre desde 1999.

Dentro del SN se encuentran 16 puntos de observación que son utilizados para realizar el censo de avifauna mensual, de los cuales 9 puntos de observación consideran miradores naturales (cerros, miradores) y que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Isla Teja, Frutillar, Punucapa, San Pedro, San Ramón, Fundo Altue, Fundo Plaza de Armas, Locuche y Cuyinhue.

El área de prospección abarca la zona propuesta para la protección en el proyecto de creación de la Reserva Nacional Río Cruces, donde se incluyen las aves presentes en áreas como Cayumapu y

Pichoy. Desde noviembre del 2004, debido a los acontecimientos que afectaron al humedal (funcionamiento de una planta de celulosa), se han llevado a cabo censos en otras áreas fuera del santuario como Guacamayo, Pichoy, San Antonio y Pailapifil, con la finalidad de evaluar la movilidad de las aves. Este censo externo que en su momento llegó a 11 sitios, actualmente considera 4 sitios: 3 por vía terrestre y 1 sitio con observación por vía fluvial.

Las actividades anteriormente descritas se realizan en dos días. Un día se desarrolla el conteo total de cisnes observados en cada uno de los sitios dentro del SN-Humedal del Río Cruces junto con el conteo de las otras especies de aves, mientras que el segundo día se realizan los conteos de cisnes por vía terrestre y fluvial en los sectores fuera del Santuario.



Mapa 1: Censos internos y externos en el Santuario de la Naturaleza, Región de Los Ríos. (Fuente: DASP, CONAF Región de Los Ríos).

4. Resultados

4.1 CISNE DE CUELLO NEGRO (*Cygnus melancoryphus*)

4.1.1 Dentro del Santuario de la Naturaleza.

El censo realizado el 28 de julio de 2018 arrojó una abundancia de 9.526 ejemplares, de los cuales un 99,7% corresponde a individuos adultos (9.502) y un 0,3% a juveniles (24) (Anexo 5.1), cifra menor a los 11.565 ejemplares contabilizados en junio pasado. Al comparar la abundancia con julio de 2017, que registró 8.375 ejemplares, se verifica un aumento en la población (Anexo 5.2). Este mes la mayor concentración de cisnes de cuello negro se localiza en los sectores de Puerto Claro (2.540), Santa María (2.400) e Isla Teja (1.000) (Anexo 5.1). La figura 1 muestra abundancias mensuales de *C. melancoryphus* desde enero de 1999 a julio de 2018.




Figura 1. Abundancia de cisnes de cuello negro período enero 1999 – julio 2018.

4.1.2 Fuera del Santuario de la Naturaleza.

El total de ejemplares de cisne de cuello negro censados en las áreas aledañas al Santuario de la Naturaleza fue de 575 ejemplares, cantidad menor a la registrada en junio pasado (700) (Anexo 5.2). La mayor cantidad de ejemplares se registró en el sector de Pichoy (250).

4.1.3 Dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza.

El número total de ejemplares censados dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza alcanzó a 10.101 ejemplares, cifra menor a la registrada en junio pasado (12.265). Al comparar la suma de las abundancias de cisnes de cuello negro dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza con las de julio de 2017 (9.830), se verifica un aumento en la población (Figura 2).




Figura 2. Abundancia de cisnes de cuello negro, dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza, período enero 2006 – julio 2018.

A continuación, se entrega información de otras aves registradas en el censo: se incluye tabla donde se presenta el número de individuos registrado en este mes de julio, su comparación con el mes anterior (junio) y con julio de 2017. Se incluye gráfico período 1999-2018.

4.2 TAGUAS (*Fulica armillata*, *F. leucoptera*, *F. rufifrons*)

Mes	N.º individuos
Julio	9.130
Junio	14.750
Julio 2017	5.450




Figura 3. Abundancia de taguas período enero 1999 – julio 2018.

Zambullidores

4.3 HUALA (*Podiceps major*)

Mes	N.º individuos
Julio	46
Junio	48
Julio 2017	43




Figura 4. Abundancia de huala período enero 1999 – julio 2018.

4.4 PICURIO (*Podilymbus podiceps*)

Mes	N.º individuos
Julio	0
Junio	5
Julio 2017	0




Figura 5. Abundancia de picurio período enero 1999 –julio 2018.

4.5 PIMPOLLO (*Rollandia rolland*)

Mes	N.º individuos
Julio	11
Junio	9
Julio 2017	13




Figura 6. Abundancia de pimpollo, período enero 1999 – julio 2018.

4.6 GARZA BOYERA (*Bubulcus ibis*)

Mes	N.º individuos
Julio	0
Junio	0
Julio 2017	0




Figura 7. Abundancia de garza boyera, período enero 1999 – julio 2018.

4.7 GARZA CHICA (*Egretta thula*)

Mes	N.º individuos
Julio	20
Junio	12
Julio 2017	17




Figura 8. Abundancia de garza chica, período enero 1999 – julio 2018.

4.8 GARZA CUCA (*Ardea cocoi*)

Mes	N.º individuos
Julio	59
Junio	60
Julio 2017	57




Figura 9. Abundancia de garza cuca, período enero de 1999 – julio 2018.

4.9 GARZA GRANDE (*Ardea alba*)

Mes	N.º individuos
Julio	17
Junio	22
Julio 2017	23




Figura 10. Abundancia de garza grande, período enero de 1999 – julio 2018.

Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos

4.10 CORMORÁN YECO (*Phalacrocorax brasilianus*)

Mes	N.º individuos
Julio	234
Junio	404
Julio 2017	188




Figura 11. Abundancia de cormorán yeco, período enero 1999 – julio 2018.

4.11 BANDURRIA (*Theristicus melanopis*)

Mes	N.º individuos
Julio	0
Junio	0
Julio 2017	0




Figura 12. Abundancia de bandurria, enero 1999 – julio 2018.

4.12 ZARAPITO (*Numenius phaeopus*)

Mes	N.º individuos
Julio	0
Junio	0
Julio 2017	0




Figura 13. Abundancia de zarapito, período enero 1999 – julio 2018.

4.13 GAVIOTA CÁHUIL (*Chroicocephalus maculipennis*)

Mes	N.º individuos
Julio	21
Junio	0
Julio 2017	7




Figura 14. Abundancia de gaviota cáhuil, período enero 1999 – julio 2018.

4.14 GAVIOTÍN PIQUERITO (*Sterna trudeaui*)

Mes	N.º individuos
Julio	0
Junio	0
Julio 2017	0




Figura 15. Abundancia de gaviotín piquerito, período enero 1999 – julio 2018.

4.15 TRILE (*Agelasticus thilius*)

Mes	N.º individuos
Julio	11
Junio	9
Julio 2017	25




Figura 16. Abundancia de trile, período enero 1999 – julio 2018.

4.16 SIETE COLORES (*Tachuris rubrigastra*)

Mes	N.º individuos
Julio	19
Junio	19
Julio 2017	24




Figura 17. Abundancia siete colores, período enero 1999 – julio 2018.

Patos

4.17 PATO ANTEOJILLO (*Specularnas specularis*)

Mes	N.º individuos
Julio	6
Junio	0
Julio 2017	4




Figura 18. Abundancia de pato anteojillo, período enero 1999 – julio 2018.

4.18 PATO JERGÓN (*Anas georgica*, *A. flavirostris*)

Mes	N.º individuos
Julio	0
Junio	0
Julio 2017	0




Figura 19. Abundancia pato jergón, enero 1999 – julio 2018.

4.19 PATO NEGRO (*Netta peposaca*)

Mes	N.º individuos
Julio	0
Junio	0
Julio 2017	0




Figura 20. Abundancia de pato negro, enero 1999 – julio 2018.

4.20 PATO REAL (*Anas sibilatrix*)

Mes	N.º individuos
Julio	28
Junio	33
Julio 2017	38




Figura 21. Abundancia de pato real, período enero 1999 – julio 2018.

4.21 PELÍCANO (*Pelecanus thagus*)

Mes	N.º individuos
Julio	10
Junio	1
Julio 2017	9




Figura 22. Abundancia de pelícano, período enero 1999 – julio 2018.

4.22 TRARO, CARANCHO (*Caracara plancus*)

Mes	N.º individuos
Julio	4
Junio	6
Julio 2017	10




Figura 23. Abundancia de traro, período enero 1999 – julio 2018.

4.23 TIUQUE (*Milvago chimango*)

Mes	N.º individuos
Julio	15
Junio	27
Julio 2017	22




Figura 24. Abundancia de tiuque, período enero 1999 – julio 2018.

4.24 QUELTEHUE (*Vanellus chilensis*)

Mes	N.º individuos
Julio	19
Junio	22
Julio 2017	13




Figura 25. Abundancia de queltehue, período enero 1999 – julio 2018.

ANEXOS

Anexo 5.1 Resultados del censo al interior del MN Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar SN Carlos Anwandter julio de 2018.

ESPECIE	Sector 1				Sector 2	Sector 3		Sector 4				Otros sectores				TOTAL
	El Molino	Punucapa	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Bellavista	Fuerte San Luis	Locuche	Cuyinhue	Isla Teja	Cayumapu	San Antonio	Río Pichoy	
Águila Pescadora		0			0		0		0							0
Bandurria		0			0		0		0							0
Becacina		0			0		0		0							0
Cisne Coscoroba		0			0		0		0							0
Cisne Cuello Negro	410	970	85	425	2.540	2.400	900	15	700	0	0	1.000	10	35	12	9.502
Cisne CN Juvenil	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Cormorán o Yeco		13			185		24		12							234
Cuervo del pantano		0			0		0		0							0
Garza Boyera		0			0		0		0							0
Garza Chica		9			4		3		4							20
Garza Cuca		13			28		10		8							59
Garza Grande		5			4		5		3							17
Gaviota Cahuil		6			8		7		0							21
Gaviotín Piquerito		0			0		0		0							0
Gaviota Dominicana		8			4		3		7							22
Huairavillo		0			0		0		0							0
Huairavo		0			0		0		0							0
Huala		16			10		8		12							46
Martín Pescador		1			0		0		0							1
Pato Anteojillo		0			0		0		6							6
Pato Jergón		0			0		0		0							0
Pato negro		0			0		0		0							0
Pato Real		0			14		6		8							28
Pelícano		6			4		0		0							10
Picurío		0			0		0		0							0
Pidén		0			0		0		0							0
Pimpollo		4			3		4		0							11
Queltehue		9			4		0		6							19
Run Run		0			0		0		0							0
Siete Colores		8			6		5		0							19
Tagua		1.200			7.000		810		120							9.130
Tagüita		0			0		0		0							0
Tiuque		6			4		2		3							15
Traro		2			1		1		0							4
Trile		7			4		0		0							11
Zarapito		0			0		0		0							0

Anexo 5.2 Valores de abundancia mensual cisnes de cuello negro dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza, período noviembre 2002 – julio 2018.

AÑO	MES	Abundancia dentro	Abundancia fuera	Suma de abundancias
2002	N	5.030		
	D	5.328		
2003	E	5.664		
	F	6.044		
	M	6.280		
	A	6.364		
	M	5.795		
	J	5.391		
	J	6.047		
	A	5.941		
	S	5.598		
	O	5.171		
	N	4.935		
2004	D	5.458		
	E	5.932		
	F	6.266		
	M	6.483		
	A	7.997		
	M	7.983		
	J	6.512		
	J	5.388		
	A	3.411		
	S	3.674		
	O	2.180		
2005	N	2.942		
	D	2.324	1.100	3.424
	E	942	1.907	2.849
	F	289	2.282	2.571
	M	570	2.018	2.588
	A	866	1.219	2.085
	M	518	288	806
	J	476	303	779
	J	290	243	533
	A	249	150	399
	S	398	295	693
	O	689	229	918
2006	N	680	315	995
	D	668	168	836
	E	436	536	972
	F	1.028	562	1.590
	M	803	402	1.205
	A	819	124	943
	M	366	543	909



	J	304	625	929
	J	253	238	491
	A	401	224	625
	S	670	285	955
	O	654	466	1.120
	N	601	925	1.526
	D	372	501	873
2007	E	386	543	929
	F	252	370	622
	M	547	510	1.057
	A	616	474	1.090
	M	379	530	909
	J	383	701	1.084
	J	297	744	1.041
	A	542	426	968
	S	806	689	1.495
	O	907	501	1.408
	N	877	658	1.535
	D	251	392	643
2008	F	214	276	490
	M	360	1.398	1.758
	A	352	1.720	2.072
	M	371	1.131	1.502
	J	249	942	1.191
	J	272	714	986
	A	252	431	683
	S	869	338	1.207
	O	972	563	1.535
	N	1.084	443	1.527
	D	1.376	349	1.725
2009	E	698	1.326	2.024
	F	613	1.289	1.902
	M	166	2.801	2.967
	A	90	4.630	4.720
	M	111	2.882	2.993
	J	158	1.251	1.409
	J	283	642	925
	A	296	685	981
	S	668	472	1.140
	O	445	620	1.065
	N	444	675	1.119
	D	581	567	1.148
2010	E	922	380	1.302
	F	972	274	1.246
	M	637	898	1.535
	A	352	754	1.106
	M	270	608	878
	J	222	518	740



	J	568	801	1.369
	A	241	533	774
	S	326	352	678
	O	407	532	939
	N	626	145	771
	D	593	790	1.383
2011	E	668	726	1.394
	F	180	1.165	1.345
	M	101	1.416	1.517
	A	165	1.782	1.947
	M	200	1.995	2.195
	J	627	1.178	1.805
	J	466	564	1.030
	A	327	353	680
	S	607	293	900
	O	730	190	920
	N	753	198	951
D	516	223	739	
2012	E	1.798	241	2.039
	F	2.176	336	2.512
	M	1.039	854	1.893
	A	1.311	1.005	2.316
	M	790	1.155	1.945
	J	644	850	1.494
	J	1.246	473	1.719
	A	1.064	166	1.230
	S	1.220	293	1.513
	O	1.197	114	1.311
	N	2.014	100	2.114
D	1.428	196	1.624	
2013	E	1.699	277	1.976
	F	1.519	733	2.252
	M	1.833	815	2.648
	A	1.430	932	2.362
	M	1.606	1.594	3.200
	J	1.442	1.065	2.507
	J	1.898	337	2.235
	A	1.789	214	2.003
	S	1.556	269	1.825
	O	1.897	162	2.059
	N	1.949	163	2.112
D	2.816	280	3.096	
2014	E	2.323	692	3.015
	F	3.062	930	3.992
	M	3.524	1.315	4.839
	A	2.821	957	3.778
	M	3.632	659	4.291
J	3.426	799	4.225	



	J	3.210	216	3.426
	A	3.498	400	3.898
	S	3.369	447	3.816
	O	2.766	325	3.091
	N	2.308	479	2.787
	D	2.958	372	3.330
2015	E	2.764	435	3.199
	F	3.121	680	3.801
	M	4.053	918	4.971
	A	3.794	540	4.334
	M	3.692	757	4.449
	J	3.650	584	4.234
	J	4.395	624	5.019
	A	3.598	274	3.872
	S	3.208	327	3.535
	O	3.396	299	3.695
	N	2.151	165	2.316
D	2.251	293	2.544	
2016	E	3.820	259	4.079
	F	3.297	385	3.682
	M	5.889	928	6.817
	A	6.815	1.241	8.056
	M	8.435	992	9.427
	J	6.238	800	7.038
	J	5.686	729	6.415
	A	4.347	698	5.045
	S	4.563	871	5.434
	O	5.324	675	5.999
	N	5.770	625	6.395
D	6.632	771	7.403	
2017	E	6.692	769	7.461
	F	6.517	1.033	7.550
	M	8.431	1332	9.763
	A	9.800	775	10.575
	M	10.362	647	11.009
	J	9.011	912	9.923
	J	8.375	1.455	9.830
	A	8.703	750	9.453
	S	7.290	727	8.017
	O	7.962	285	8.247
	N	8.134	506	8.640
D	9.066	556	9.622	
2018	E	11.502	721	12.223
	F	12.955	1.175	14.130
	M	12.314	956	13.270
	A	10.834	1.440	12.274
	M	10.817	1.110	11.927
	J	11.565	700	12.265




	J	9.526	575	10.101
--	---	-------	-----	--------



Anexo 5.3 Abundancia mensual y promedio anual de cisne de cuello negro en MN Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar SN Carlos Anwandter, enero 2000 – julio 2018.

Años	MESES DEL AÑO												Promedio
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviemb	Diciemb	
2000	5.093	7.998	6.923	6.867	6.943	6.313	3.438	4.897	5.010	5.002	4.532	4.623	5.637
2001	5.997	5.502	5.881	5.654	1.729	5.421	5.654	4.712	3.648	4.225	4.365	4.421	4.767
2002	5.537	6.029	6.359	6.666	6.160	6.292	5.572	5.816	5.752	4.783	5.030	5.328	5.777
2003	5.664	6.044	6.280	6.364	5.795	5.391	6.047	5.941	5.598	5.171	4.935	5.458	5.724
2004	5.932	6.266	6.483	7.997	7.983	6.512	5.388	3.411	3.674	2.180	2.942	2.324	5.091
2005	942	289	570	866	518	476	290	249	398	689	680	668	553
2006	436	1.028	803	819	366	304	253	401	670	654	601	372	559
2007	386	252	547	616	379	383	297	542	806	907	877	251	520
2008	311	214	360	352	801	249	272	252	869	972	1.084	1.376	593
2009	698	613	166	90	111	158	283	296	668	445	444	581	379
2010	922	972	637	352	270	222	568	241	326	407	626	593	511
2011	668	180	101	165	200	627	466	327	607	730	753	516	445
2012	1.798	2.176	1.039	1.311	790	644	1.246	1.064	1.220	1.197	2.014	1.428	1.327
2013	1.699	1.519	1.833	1.430	1.606	1.442	1.898	1.789	1.556	1.897	1.949	2.816	1.786
2014	2.323	3.062	3.524	2.821	3.632	3.426	3.210	3.498	3.369	2.766	2.308	2.958	3.075
2015	2.764	3.121	4.053	3.794	3.692	3.650	4.395	3.598	3.208	3.396	2.151	2.251	3.339
2016	3.820	3.297	5.889	6.815	8.435	6.238	5.686	4.347	4.563	5.324	5.770	6.632	5.568
2017	6.692	6.517	8.431	9.800	10.362	9.011	8.375	8.649	7.290	8.012	8.119	9.066	8.360
2018	11.502	12.955	12.314	10.834	10.817	11.565	9.526						11.359



Santuario de la Naturaleza
Río Cruces y Chorocamayo



Sitio Ramsar
Carlos Anwandter

¡Súmate!

