

SANTUARIO DE LA NATURALEZA CARLOS ANWANDTER HUMEDAL DEL RIO CRUCES

Abril de 2015



**Corporación Nacional Forestal
CONAF
Oficina Provincial Valdivia
Región de Los Ríos**

Índice

Capítulo	Página
Resumen	3
Introducción.....	3
Metodología Utilizada	3
Cisnes de cuello negro dentro del Santuario.....	6
Cisnes en áreas fuera del Santuario.....	6
Taguas.....	7
Zambullidores.....	8
Garzas.....	9
Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos.....	11
Gaviota cahuil, Gaviotín piquerito, Trile y Siete colores.....	12
Patos.....	14
Otras observaciones realizadas por los Guardafauna	16
Anexos.....	17

Foto portada: Cisnes de cuello negro.

Fuente: archivo fotográfico CONAF

Resumen

Dentro del Santuario, la riqueza de avifauna fue de 18 especies este mes, cinco menos que el mes de marzo de 2015. El conteo de cisnes arrojó una disminución en la cantidad de 4053 en marzo a 3794 individuos (Anexo 1). La mayoría de los cisnes se localizan en el sector de Puerto Claro (1310). En el censo realizado en áreas aledañas al Santuario, se contabilizaron 540 cisnes observándose la mayor concentración de ejemplares en el sector Guacamayo con 430 individuos. La totalidad de Cisnes contabilizados dentro y fuera del Santuario alcanza a 4334 individuos, inferior respecto de marzo donde se observaron 4971 ejemplares (Anexo 2).

Introducción

El presente informe tiene por propósito mostrar las estadísticas correspondientes al mes de **abril de 2015**, recabadas mensualmente por los guardafauna del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter.

Las estadísticas para un conjunto de aves del Santuario (Humedal del Río Cruces) se entregan en los anexos, y para grupos selectos de aves se presentan gráficos desde enero de 1999 a la fecha.

La metodología empleada se basa en observaciones visuales en movimiento (vía acuática mediante lanchas y vía terrestre en vehículo para acceder a puntos de observación fuera del santuario) y 10 estaciones terrestres ubicadas en posiciones estratégicas para el avistamiento de aves dentro del humedal.

Metodología Utilizada

La metodología empleada en los censos periódicos de la avifauna al interior del Humedal del Río Cruces, cuenta básicamente de dos estrategias: una es la utilización de estaciones fijas en altura las cuales permiten contabilizar las especies de gran abundancia poblacional (ie. Cisne de Cuello Negro *Cygnus melancoryphus*, Pato Yeco

Phalacrocorax brasilianus, Taguas *Fulica sp*, entre otras). La otra estrategia empleada es la de monitoreos móviles o recorridos, desde un sector a otro, lo cual permite determinar el número de individuos de las especies de menor tamaño y menor abundancia poblacional (Pimpollo *Rollandia rolland*, Picurio *Podilymbus podiceps*, Garza Cuca *Ardea cocoi*, Garza Grande *Casmerodius albus*, Garza Chica *Egretta thula*, Águila Pescadora *Pandion haliaetus*, entre otras), así como también contabilizar la presencia de aquellas especies de mayor abundancia pero que, por las condiciones geográficas del lugar dificultan el registro de las estaciones fijas. Estos recorridos se realizan sistemáticamente en lancha a una velocidad adecuada para no generar la movilidad de las aves hacia otras áreas del Santuario. La metodología descrita para el caso de los Cisnes se viene realizando desde 1982 pero con mejoras sustanciales desde 1987, mientras que para el resto de las aves esto ocurre desde 1999. Dentro del Santuario se encuentran torres de observación que son utilizadas para realizar el censo de Avifauna mensual. Estas torres se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

- 1.- Torres de observación naturales: Isla Teja, Punucapa, Fundo Altue – sector Pichoy, Fundo Plaza de Armas – sector Pichoy, Locuche – sector Cuyinhue.
- 2.- Torres de observación fabricadas por Guardafauna: Santa María, Puerto Claro, San Pedro – San Ramón.

El área de prospección abarca la zona propuesta para la protección en el proyecto de reserva del Río Cruces, donde se incluyen las aves presentes en áreas como Cayumapu y Pichoy.

Por otro lado desde noviembre del 2004, debido a los acontecimientos que afectaron al humedal, se han llevado a cabo censos en otras áreas fuera del Santuario con la finalidad de evaluar la movilidad de las aves. Este censo se realiza en 12 sitios con acceso por vía terrestre y 4 sitios con observación por vía fluvial, lo que suma un total de 16 sitios de conteo fuera del Santuario.

Las actividades anteriormente descritas se realizan en dos días. Un día se desarrolla el conteo total de Cisnes observados en cada uno de los sitios dentro del Santuario del Humedal del Río Cruces junto con el conteo de las otras especies de aves, mientras que el segundo día se realizan los conteos de Cisnes por vía terrestre y fluvial en los sectores fuera del Santuario.

Cisnes de cuello negro dentro del Santuario

El censo efectuado el día 29 de abril, arroja una abundancia de 3794 ejemplares de **Cisne de cuello negro** (Anexo 1). Esta cifra es inferior a los 4053 ejemplares contabilizados el mes pasado (marzo). Al comparar la abundancia con abril de 2014 (2821 individuos), se verifica un aumento de 973 individuos (Anexo 3). Este mes la mayor concentración de Cisnes en el Santuario se localiza en el sector Puerto Claro con 1310 individuos. (Anexo 1). La figura 1 muestra la evolución del movimiento de abundancia de estas aves desde enero de 1999 a abril de 2015.



Figura 1. Abundancia de Cisnes de cuello negro desde enero 1999 a abril de 2015.

Cisnes en áreas fuera del Santuario

El total de ejemplares de **Cisne de cuello negro** censados en las áreas aledañas al Santuario disminuyó con respecto al mes anterior de 918 a 540 individuos contabilizados (Anexo 2). Destaca la presencia de 430 ejemplares registrados en el sector Guacamayo.

El número total de ejemplares censados dentro y fuera del Santuario alcanza los 4334 individuos, cifra inferior a la población del mes pasado (4971 individuos). Al comparar la suma de las abundancias de Cisnes dentro y fuera del Santuario con las de abril de 2014 (3778 individuos), se verifica un aumento de 556 individuos (Figura 2).




Figura 2. Abundancia de Cisnes de cuello negro, dentro y fuera del santuario desde enero 2005 a abril de 2015.

Taguas

En el caso de las **Taguas** (*Fulica armillata*, *F. leucoptera*, *F. rufifrons*) se observan 502 ejemplares este mes. El mes pasado se avistaron 706 ejemplares. El número de individuos es inferior respecto a abril de 2014, para aquella fecha se contabilizaron 1510 ejemplares de Taguas.




Figura 3. Abundancia de Taguas desde enero de 1999 a abril de 2015.

Zambullidores

La **Huala** (*Podiceps major*) presenta una abundancia de 45 individuos, algo inferior que el mes pasado en que se registraron 56 ejemplares. Con respecto a abril de 2014, la abundancia se presenta con 30 individuos.

Huala




Figura 4. Abundancia de Huala desde enero de 1999 a abril de 2015.

Ejemplares de **Picurio** (*Podilymbus podiceps*) Se registraron 6 individuos este mes. En marzo pasado se registraron 4 ejemplares, mientras que en abril de 2014 se contabilizaron 4 ejemplares en el Santuario.

Picurio




Figura 5. Abundancia Picurio desde enero 1999 a abril de 2015.

Pimpollo (*Rollandia rolland*). Se registran 8 ejemplares el presente mes. Se avistaron 3 ejemplares en el mes pasado. En abril de 2014 se avistaron 4 individuos en el Santuario.




Figura 6. Abundancia de Pimpollo desde enero de 1999 a abril de 2015

Garzas

Garza boyera (*Bubulcus ibis*). Se registran 10 individuos el presente mes. El mes pasado se registraron 101 ejemplares. En abril de 2014 se contabilizaron 10 ejemplares de Garza boyera en el Santuario.




Figura 7. Abundancia de Garza boyera desde enero de 1999 a abril de 2015.

Garza chica (*Egretta thula*) Se avistaron 24 ejemplares. En el mes de marzo pasado se registraron 53 ejemplares; En abril de 2014 se registraron 24 individuos.




Figura 8. Abundancia de Garza chica desde enero de 1999 a abril de 2015.

Garza cuca (*Ardea cocoi*) se avistan 28 individuos este mes, cifra inferior a los 38 contabilizados en el mes pasado. Esta especie presentó un número de 27 ejemplares contabilizados en abril de 2014.




Figura 9. Abundancia de Garza cuca desde enero de 1999 a abril de 2015.

La abundancia de **Garza grande** (*Casmerodius albus*) es de 31 ejemplares; inferior que los 36 contabilizados en el mes de marzo. En el mes de abril de 2014 se avistaron 23 ejemplares.




Figura 10. Abundancia de Garza grande desde enero de 1999 a abril de 2015.

Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos

Se contabilizaron 113 individuos de **Cormoranes** (*Phalacrocorax brasilianus*), número inferior comparado con el mes de marzo donde se registraron 235 ejemplares. Esta cifra es superior a la registrada en abril de 2014 ya que para esa fecha se contabilizaron 37 ejemplares.




Figura 11. Abundancia de Cormoranes desde enero de 1999 a abril de 2015.

El presente mes no se registraron individuos de **Bandurria** (*Theristicus melanopis*); en el mes de marzo no se contabilizaron ejemplares. En abril de 2014 no se registraron individuos en el Santuario.




Figura 12. Abundancia de Bandurria desde enero de 1999 a abril de 2015.

Durante el presente mes no se avistaron ejemplares de **Zarapito** (*Numenius phaeopus*). El mes pasado se observaron 6 individuos. En abril de 2014 no se registraron ejemplares en el Santuario.




Figura 13. Abundancia de Zarapito desde enero de 1999 a abril de 2015

Gaviota cahuil, Gaviotín piquerito, Trile y Siete colores

La abundancia de **Gaviota cahuil** (*Larus maculipennis*) presentó 59 individuos este mes. En el mes de marzo se registraron 72 ejemplares en el Santuario. Para abril de 2014 se avistaron 11 individuos.




Figura 14. Abundancia de Gaviota cahuil desde enero de 1999 a abril de 2015

Gaviotín piquerito (*Sterna trudeaui*) no registra individuos para el presente mes. El mes pasado (marzo) no se observaron individuos. En abril de 2014 no se registraron individuos dentro del Santuario.




Figura 15. Abundancia de Gaviotín piquerito desde enero de 1999 a abril de 2015.

Para este mes no se registraron individuos de **Trile** (*Agelaius thilius*). En el mes de marzo pasado tampoco se observaron ejemplares. En abril de 2014 no se avistaron individuos de Trile en el Santuario.




Figura 16. Abundancia Trile desde enero de 1999 a abril de 2015.

La abundancia de **Siete colores** (*Tachuris rubrigastra*), no registró ejemplares este mes en el Santuario. En el mes de marzo se registraron 3 ejemplares. En el mes de abril de 2014 no se avistaron individuos en el Santuario.




Figura 17. Abundancia Siete colores desde enero de 1999 a abril de 2015.

Patos

Pato anteojillo (*Specularias specularis*) no se registraron ejemplares en este mes. En el mes anterior (marzo) tampoco se registraron ejemplares de esta especie. En cuanto a abril de 2014, se contabilizaron 6 individuos en el Santuario.




Figura 18. Abundancia Pato anteojillo desde enero de 1999 a abril de 2015.

Se avistaron 274 ejemplares de **Pato jergón** (*Anas georgica*, *A. flavirostris*) este mes. En marzo se registraron 267 individuos. En el mes de abril de 2014 no se registraron ejemplares de esta especie en el Santuario.




Figura 19. Abundancia Pato jergón desde enero de 1999 a abril de 2015.

Pato negro (*Netta peposaca*) Este mes no se registraron ejemplares. El mes pasado tampoco se avistaron ejemplares. Esta especie dejó de avistarse en el Santuario a partir de junio de 2001.

Pato real (*Anas sibilatrix*) muestra presencia de 218 individuos durante el presente mes. En el mes de marzo pasado se registraron 287 individuos. En cuanto a abril de 2014, se registraron 63 ejemplares en el Santuario.




Figura 20. Abundancia de Pato real desde enero de 1999 a abril de 2015.

Otras observaciones realizadas por los guardafauna

01/04/15 Prospección de huillín. San Ramón, San Pedro, La Dehesa. Se encontró fecas de huillín.

06/04/15 Patrullaje Isla Huape, Punucapa, Cau Cau , La Dehesa. En Punucapa se encontraron cuatro cisnes adultos, muertos por visón.

08/04/15 Patrullaje San Ramón , San Pedro. Se entrega un visón a UACH.

10/04/15 Patrullaje Tambillo ,Pto. Claro, Chorocamayo. Condiciones del agua : clara.

15/04/15 Recolección de fecas de visón para estudio en Cau Cau, Frutillar, El Molino, La Dehesa, Punucapa San Ramón, San Pedro.

16/04/15 Recolección de fecas de visón para estudio en El Tambillo, Pto. Claro, Cayumapu, Rebellín, San Antonio, Altúe, Santa María, Chunimpa, Fuerte San Luis, Locuche, Cuyinhue.

22/04/15 En Cau Cau se observó un huillín alimentándose a las 10:30 hrs. Luego en el río Calle Calle se observó un huillín alimentándose, a las 11:00 hrs.

27/04/15 Revisión de trampas de visón en La Dehesa, Cau Cau, San Pedro, San Ramón. .

28/04/15 En San Antonio se observó un huillín nadando por el cauce del estero.

Anexo 1	Resultados del censo del mes de ABRIL de 2015														Total
	AL INTERIOR DEL SANTUARIO (conteo realizado el 29 de ABRIL de 2015)														
Especie	Sector 1				Sector 2	Sector 3		Sector 4				Otros sectores			
	El Molino	Punucapa	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Bellavista	Fuerte San Luis	Locuche	Cuyinhue	Isla Teja	Cayumapu	San Antonio	Rio Pichoy
Cormorán o Yeco		15			80		8		10						113
Águila Pescadora															-
Bandurria															-
Becacina															-
Cisne Coscoroba															-
Cisne Cuello Negro	250	635	146	230	1.310	745	85	130	12		52		143	56	3.794
Cuervo del pantano															-
Garza Boyera									10						10
Garza Chica		8			5		6		5						24
Garza Cuca		9			6		7		6						28
Garza Grande		6			9		9		7						31
Gaviota Cahuil		25			18		10		6						59
GavotínPiquerito															-
Gaviota Dominicana		8			4		5								17
Huairavillo															-
Huairavo															-
Huala		11			15		7		12						45
Martín Pescador		1							1						2
Pato Anteojillo															-
Pato Jergón		126			135		13								274
Pato negro															-
Pato Real		120			50		35		13						218
Pelicano															-
Picurio		4					2								6
Pidén															-
Pimpollo		3					5								8
Queltehue					6		4		4						14
Run Run															-
Siete Colores															-
Tagua		145			280		65		12						502
Tagüita															-
Tiuque		6			5		4		3						18
Traro		3			4		1								8
Trile															-
Zarapito															-

ANEXO 2		Valores de abundancia del Cisne de cuello negro dentro y fuera del Santuario del río Cruces.							
AÑO	MES	Abundancia dentro	Abundancia fuera	Suma de abundancias					
2002	N	5.030			2009	E	698	1326	2.024
	D	5.328				F	613	1289	1.902
2003	E	5.664				M	166	2801	2.967
	F	6.044				A	90	4630	4.720
	M	6.280				M	111	2882	2.993
	A	6.364				J	158	1251	1.409
	M	5.795				J	283	642	925
	J	5.391				A	296	685	981
	J	6.047				S	668	472	1.140
	A	5.941				O	445	620	1.065
	S	5.598				N	444	675	1.119
	O	5.171				D	581	567	1.148
	N	4.935			2010	E	922	380	1.302
	D	5.458				F	972	274	1.246
2004	E	5.932				M	637	898	1.535
	F	6.266				A	352	754	1.106
	M	6.483				M	270	608	878
	A	7.997				J	222	518	740
	M	7.983				J	568	801	1.369
	J	6.512				A	241	533	774
	J	5.388				S	326	352	678
	A	3.411				O	407	532	939
	S	3.674				N	626	145	771
	O	2.180				D	593	790	1.383
	N	2.942			2011	E	668	726	1.394
	D	2.324	1.100	3.424		F	180	1165	1.345
2005	E	942	1.907	2.849		M	101	1416	1.517
	F	289	2.282	2.571		A	165	1782	1.947
	M	570	2.018	2.588		M	200	1995	2.195
	A	866	1.219	2.085		J	627	1178	1.805
	M	518	288	806		J	466	564	1.030
	J	476	303	779		A	327	353	680
	J	290	243	533		S	607	293	900
	A	249	150	399		O	730	190	920
	S	398	295	693		N	753	198	951
	O	689	229	918		D	516	223	739
	N	680	315	995	2012	E	1798	241	2.039
	D	668	168	836		F	2176	336	2.512
2006	E	436	536	972		M	1039	854	1.893
	F	1.028	562	1.590		A	1311	1005	2.316
	M	803	402	1.205		M	790	1155	1.945
	A	819	124	943		J	644	850	1.494
	M	366	543	909		J	1246	473	1.719
	J	304	625	929		A	1064	166	1.230
	J	253	238	491		S	1220	293	1.513
	A	401	224	625		O	1197	114	1.311
	S	670	285	955		N	2014	100	2.114
	O	654	466	1.120		D	1428	196	1.624
	N	601	925	1.526	2013	E	1699	277	1.976
	D	372	501	873		F	1519	733	2.252
2007	E	386	543	929		M	1833	815	2.648
	F	252	370	622		A	1430	932	2.362
	M	547	510	1.057		M	1606	1594	3.200
	A	616	474	1.090		J	1442	1065	2.507
	M	379	530	909		J	1898	337	2.235
	J	383	701	1.084		A	1789	214	2.003
	J	297	744	1.041		S	1556	269	1.825
	A	542	426	968		O	1897	162	2.059
	S	806	689	1.495		N	1949	163	2.112
	O	907	501	1.408		D	2816	280	3.096
	N	877	658	1.535	2014	E	2323	692	3.015
	D	251	392	643		F	3062	930	3.992
2008	F	214	276	490		M	3524	1315	4.839
	M	360	1.398	1.758		A	2821	957	3.778
	A	352	1.720	2.072		M	3632	659	4.291
	M	371	1.131	1.502		J	3426	799	4.225
	J	249	942	1.191		J	3210	216	3.426
	J	272	714	986		A	3498	400	3.898
	A	252	431	683		S	3369	447	3.816
	S	869	338	1.207		O	2766	325	3.091
	O	972	563	1.535		N	2308	479	2.787
	N	1084	443	1.527		D	2958	372	3.330
	D	1376	349	1.725	2015	E	2764	435	3.199
						F	3121	680	3.801
				M		4053	918	4.971	
				A		3794	540	4.334	
				M					
				J					
				J					
				A					
				S					
				O					
				N					
				D					

Anexo 3. Abundancia mes a mes y Promedio anual de la especie Cisne de cuello negro.													
Santuario del Río Cruces													
MESES DEL AÑO													Promedio
Años	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviemb	Diciemb	Mensual
2000	5.093	7.998	6.923	6.867	6.943	6.313	3.438	4.897	5.010	5.002	4.532	4.623	5.637
2001	5.997	5.502	5.881	5.654	1.729	5.421	5.654	4.712	3.648	4.225	4.365	4.421	4.767
2002	5.537	6.029	6.359	6.666	6.160	6.292	5.572	5.816	5.752	4.783	5.030	5.328	5.777
2003	5.664	6.044	6.280	6.364	5.795	5.391	6.047	5.941	5.598	5.171	4.935	5.458	5.724
2004	5.932	6.266	6.483	7.997	7.983	6.512	5.388	3.411	3.674	2.180	2.942	2.324	5.091
2005	942	289	570	866	518	476	290	249	398	689	680	668	553
2006	436	1.028	803	819	366	304	253	401	670	654	601	372	559
2007	386	252	547	616	379	383	297	542	806	907	877	251	520
2008	311	214	360	352	371	249	272	252	869	972	1.084	1.376	557
2009	698	613	166	90	111	158	283	296	668	445	444	581	379
2010	922	972	637	352	270	222	568	241	326	407	626	593	511
2011	668	180	101	165	200	627	466	327	607	730	753	516	445
2012	1.798	2.176	1.039	1.311	790	644	1.246	1.064	1.220	1.197	2.014	1.428	1.327
2013	1.699	1.519	1.833	1.430	1.606	1.442	1.898	1.789	1.556	1.897	1.949	2.816	1.786
2014	2.323	3.062	3.524	2.821	3.632	3.426	3.210	3.498	3.369	2.766	2.308	2.958	3.075
2015	2.764	3.121	4.053	3.794									3.433