

# SANTUARIO DE LA NATURALEZA CARLOS ANWANDTER HUMEDAL DEL RIO CRUCES

Abril de 2013



**Corporación Nacional Forestal  
CONAF  
Oficina Provincial Valdivia  
Región de Los Ríos**

## Índice

Capítulo	Página
Resumen .....	3
Introducción.....	3
Metodología Utilizada .....	3
Cisnes de cuello negro dentro del Santuario.....	6
Cisnes en áreas fuera del Santuario.....	6
Taguas.....	7
Zambullidores .....	8
Garzas .....	10
Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos.....	12
Gaviota cahuil, Gaviotín piquerito, Trile y Siete colores .....	14
Patos.....	16
Otras observaciones realizadas por los Guardafauna .....	18
Anexos.....	19

**Foto portada: Cisnes de cuello negro**

Fuente: archivo fotográfico CONAF

## Resumen

Dentro del Santuario, la riqueza de avifauna fue de 22 especies este mes, una mas que el mes de marzo de 2013. El conteo de cisnes arrojó una disminución en la cantidad de 1833 en marzo a 1430 individuos (Anexo 1). La mayoría de los cisnes se localiza en los sectores Punucapa (280) , Puerto Claro (285) y Cayumapu (280). En el censo realizado en áreas aledañas al Santuario, se contabilizaron 932 cisnes observándose la mayor concentración de ejemplares en el sector Guacamayo con 742 individuos. La totalidad de Cisnes contabilizados dentro y fuera del Santuario alcanza a 2362 individuos, inferior respecto de marzo donde se observaron 2648 ejemplares (Anexo 2).

## Introducción

El presente informe tiene por propósito mostrar las estadísticas correspondientes al mes de **abril de 2013**, recabadas mensualmente por los guardafauna del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter.

Las estadísticas para un conjunto de aves del Santuario (Humedal del Río Cruces) se entregan en los anexos, y para grupos selectos de aves se presentan gráficos desde enero de 1999 a la fecha.

La metodología empleada se basa en observaciones visuales en movimiento (vía acuática mediante lanchas y vía terrestre en vehículo para acceder a puntos de observación fuera del santuario) y 10 estaciones terrestres ubicadas en posiciones estratégicas para el avistamiento de aves dentro del humedal.

## Metodología Utilizada

La metodología empleada en los censos periódicos de la avifauna al interior del Humedal del Río Cruces, cuenta básicamente de dos estrategias: una es la utilización de estaciones fijas en altura las cuales permiten contabilizar las especies de gran abundancia poblacional (ie. Cisne de Cuello Negro *Cygnus melancoryphus*, Pato Yeco *Phalacrocorax brasilianus*, Taguas *Fulica sp*, entre otras). La otra estrategia empleada es

la de monitoreos móviles o recorridos, desde un sector a otro, lo cual permite determinar el número de individuos de las especies de menor tamaño y menor abundancia poblacional (*Pimpollo Rollandia rolland*, *Picurio Podilymbus podiceps*, *Garza Cuca Ardea cocoi*, *Garza Grande Casmerodius albus*, *Garza Chica Egretta thula*, *Águila Pescadora Pandion haliaetus*, entre otras), así como también contabilizar la presencia de aquellas especies de mayor abundancia pero que, por las condiciones geográficas del lugar dificultan el registro de las estaciones fijas. Estos recorridos se realizan sistemáticamente en lancha a una velocidad adecuada para no generar la movilidad de las aves hacia otras áreas del Santuario. La metodología descrita para el caso de los Cisnes se viene realizando desde 1982 pero con mejoras sustanciales desde 1987, mientras que para el resto de las aves esto ocurre desde 1999. Dentro del Santuario se encuentran torres de observación que son utilizadas para realizar el censo de Avifauna mensual. Estas torres se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

- 1.- Torres de observación naturales: Isla Teja, Punucapa, Fundo Altue – sector Pichoy, Fundo Plaza de Armas – sector Pichoy, Locuche – sector Cuyinhue.
- 2.- Torres de observación fabricadas por Guardafauna: Santa María, Puerto Claro, San Pedro – San Ramón.


El área de prospección abarca la zona propuesta para la protección en el proyecto de reserva del Río Cruces, donde se incluyen las aves presentes en áreas como Cayumapu y Pichoy.

Por otro lado desde noviembre del 2004, debido a los acontecimientos que afectaron al humedal, se han llevado a cabo censos en otras áreas fuera del Santuario con la finalidad de evaluar la movilidad de las aves. Este censo se realiza en 12 sitios con acceso por vía terrestre y 4 sitios con observación por vía fluvial, lo que suma un total de 16 sitios de conteo fuera del Santuario.

Las actividades anteriormente descritas se realizan en dos días. Un día se desarrolla el conteo total de Cisnes observados en cada uno de los sitios dentro del Santuario del Humedal del Río Cruces junto con el conteo de las otras especies de aves, mientras que el segundo día se realizan los conteos de Cisnes por vía terrestre y fluvial en los sectores fuera del Santuario.

## Cisnes de cuello negro dentro del Santuario

El censo efectuado el día 30 de abril, arroja una abundancia de 1430 ejemplares de **Cisne de cuello negro** (Anexo 1). Esta cifra es inferior a los 1833 ejemplares contabilizados el mes pasado (marzo). Al comparar la abundancia con marzo de 2012 (1311 individuos), se verifica un aumento de 119 individuos (Anexo 3). Este mes la mayor concentración de Cisnes en el Santuario se localiza en los sectores de Punucapa ,Puerto Claro y Cayumapu con 280, 285 y 280 individuos respectivamente (Anexo 1). La figura 1 muestra la evolución del movimiento de abundancia de estas aves desde enero de 1999 a abril de 2013.




*Figura 1. Abundancia de Cisnes de cuello negro desde enero 1999 a abril de 2013.*

## Cisnes en áreas fuera del Santuario

El total de ejemplares de **Cisne de cuello negro** censados en las áreas aledañas al Santuario aumentó con respecto al mes anterior de 815 a 932 individuos contabilizados (Anexo 2). Destaca la presencia de 742 ejemplares registrados en el sector Guacamayo.


El número total de ejemplares censados dentro y fuera del Santuario alcanza los 2362 individuos, cifra inferior a la población del mes pasado (2648 individuos). Al comparar la suma de las abundancias de Cisnes dentro y fuera del Santuario con las de marzo de 2012 (2316 individuos), se verifica un aumento de 46 individuos (Figura 2).



**Figura 2.** Abundancia de Cisnes de cuello negro, dentro y fuera del santuario desde enero 2005 a abril de 2013.

### Taguas

En el caso de las **Taguas** (*Fulica armillata*, *F. leucoptera*, *F. rufifrons*) se observa un aumento de individuos respecto al mes pasado de 606 a 619 ejemplares. El número de ejemplares es inferior respecto a abril de 2012, para aquella fecha se contabilizaron 701 ejemplares de Taguas.




**Figura 3.** Abundancia de Taguas desde enero de 1999 a abril de 2013.

## Zambullidores

La **Huala** (*Podiceps major*) presenta una abundancia de 40 individuos, inferior que el mes pasado en que se registraron 58 ejemplares. Con respecto a abril de 2012, la abundancia se presenta con 61 individuos.


### Huala



**Figura 4.** Abundancia de Huala desde enero de 1999 a abril de 2013.


Ejemplares de **Picurio** (*Podilymbus podiceps*) se registraron 4 individuos este mes. En marzo pasado se registraron 15, mientras que en abril de 2012 se contabilizaron 5 ejemplares.





*Figura 5. Abundancia Picurio desde enero 1999 a abril de 2013.*


**Pimpollo** (*Rollandia rolland*). Se registran 4 ejemplares el presente mes. 12 ejemplares se avistaron en el mes pasado. En abril de 2012 se contabilizaron 8 individuos en el Santuario.



*Figura 6. Abundancia de Pimpollo desde enero de 1999 a abril de 2013.*


## Garzas

**Garza boyera** (*Bubulcus ibis*). Se registran 6 individuos el presente mes. El mes pasado se registraron 25 ejemplares. En abril de 2012 se contabilizaron 6 ejemplares de Garza boyera en el Santuario.




**Figura 7.** Abundancia de *Garza boyera* desde enero de 1999 a abril de 2013.

**Garza chica** (*Egretta thula*) Se avistaron 47 ejemplares. En el mes de marzo pasado se registraron 60 ejemplares; En abril de 2012 se registraron 59 individuos.




**Figura 8.** Abundancia de *Garza chica* desde enero de 1999 a abril de 2013.

**Garza cuca** (*Ardea cocoi*) se avistan 26 individuos este mes, cifra algo inferior a los 33 contabilizados en el mes pasado. Esta especie presentó un número de 22 ejemplares contabilizados en abril de 2012.



**Figura 9.** Abundancia de *Garza cuca* desde enero de 1999 a abril de 2013.


La abundancia de **Garza grande** (*Casmerodius albus*) es de 54 ejemplares; superior que los 44 contabilizados en el mes de marzo. En el mes de abril de 2012 se avistaron 48 ejemplares.



*Figura 10. Abundancia de Garza grande desde enero de 1999 a abril de 2013.*


### **Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos**

Se contabilizaron 45 individuos de **Cormoranes** (*Phalacrocorax brasilianus*), número inferior comparado con el mes de marzo donde se registraron 120 ejemplares. Esta cifra es superior a la registrada en abril de 2012 ya que para esa fecha se contabilizaron 81 ejemplares.




*Figura 11. Abundancia de Cormoranes desde enero de 1999 a abril de 2013.*

El presente mes no se registraron individuos de **Bandurria** (*Theristicus melanopis*); en el mes de marzo tampoco se contabilizaron ejemplares. En abril de 2012 no se registraron individuos en el Santuario.



*Figura 12.* Abundancia de Bandurria desde enero de 1999 a abril de 2013.


Durante el presente mes no se avistaron ejemplares de **Zarapito** (*Numenius phaeopus*). El mes pasado tampoco se observaron individuos. En abril de 2012 no se registraron ejemplares en el Santuario.



*Figura 13.* Abundancia de Zarapito desde enero de 1999 a abril de 2013


### Gaviota cahuil, Gaviotín piquerito, Trile y Siete colores

La abundancia de **Gaviota cahuil** (*Larus maculipennis*) presentó 37 individuos. En el mes de marzo se registraron 53 ejemplares en el Santuario. Para abril de 2012 se avistaron 29 individuos.




**Figura 14.** Abundancia de *Gaviota cahuil* desde enero de 1999 a abril de 2013.

**Gaviotín piquerito** (*Sterna trudeaui*) No registra individuos para el presente mes. El mes pasado (marzo) tampoco se observaron individuos. En abril de 2012 no se registraron individuos dentro del Santuario.




**Figura 15.** Abundancia de Gaviotín piquerito desde enero de 1999 a abril de 2013.

Para este mes no se registraron individuos de **Trile** (*Agelaius thilius*). En el mes de marzo pasado tampoco se observaron ejemplares. En abril de 2012 no se avistaron individuos de Trile en el Santuario.



**Figura 16.** Abundancia Trile desde enero de 1999 a abril de 2013.


La abundancia de **Siete colores** (*Tachuris rubrigastra*), registró 2 ejemplares este mes en el Santuario. En el mes de marzo se registraron 6 ejemplares. La cifra del mes de abril de 2012 fue de 9 ejemplares.



**Figura 17.** Abundancia Siete colores desde enero de 1999 a abril de 2013.

### Patos


**Pato anteojillo** (*Specularias specularis*) Se registran 4 ejemplares en este mes. En el mes anterior (marzo) se registraron 6 ejemplares de esta especie. En cuanto a abril de 2012, no se contabilizaron individuos en el Santuario.



**Figura 18.** Abundancia Pato anteojillo desde enero de 1999 a abril de 2013.




Se avistaron 45 ejemplares de **Pato jergón** (*Anas georgica*, *A. flavirostris*) este mes. En marzo se registraron 12 individuos. En el mes de abril de 2012 se registraron 57 ejemplares de esta especie en el Santuario.



**Figura 19.** Abundancia Pato jergón desde enero de 1999 a abril de 2013.

**Pato negro** (*Netta peposaca*) no fue detectado este mes al igual que en los meses precedentes. Solo hubo uno en el mes de enero. Tampoco hubo presencia de la especie en el censo de abril de 2012. Esta especie dejó de avistarse en el Santuario a partir de junio de 2001.

**Pato real** (*Anas sibilatrix*) muestra presencia de 58 individuos durante el presente mes. En el mes de marzo pasado se registraron 30 individuos. En cuanto a abril de 2012, se registraron 84 ejemplares en el Santuario.



*Figura 20. Abundancia de Pato real desde enero de 1999 a abril de 2013.*

### **Otras observaciones realizadas por los Guardafauna**

01/04/13 Se efectúa patrullaje sector El Molino, Punucapa, Pte. Cruces, San Ramón, San Pedro. Sin novedad.

02/04/13 Patrullaje sector Pte. Cruces, Frutillar, Estero La Culebra. El agua permanece clara.

04/04/13 Patrullaje río Cruces y prospección de huillín.

16/04/13 Limpieza de sendero mirador San Ramón para mejor ejecución de las faenas.

24/04/13 Prospección de Huillín sector El Pesquero. No se encontraron evidencias.

29/04/13 En sector San Antonio se observaron dos huillines adultos.

Anexo 1	Resultados del censo del mes de ABRIL de 2013															
	AL INTERIOR DEL SANTUARIO (conteo realizado el 30 de ABRIL de 2013)															
Especie	Sector 1			Sector 2	Sector 3		Sector 4			Otros sectores				Total		
	El Molino	Punucapa	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Bellavista	Fuerte San Luis	Locuche	Cuyinhue	Isla Teja	Cayumapu		San Antonio	Rio Pichoy
Cormorán o Yeco		10			15		8		12							45
Águila Pescadora																-
Bandurria																-
Becacina																-
Cisne Coscoroba																-
<b>Cisne Cuello Negro</b>	<b>24</b>	<b>280</b>	<b>10</b>	<b>150</b>	<b>285</b>	<b>185</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>70</b>			<b>54</b>	<b>280</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>1.430</b>
Cuervo del pantano																-
Garza Boyera							6									6
Garza Chica		10			13		9		15							47
Garza Cuca		5			7		5		9							26
Garza Grande		17			14		11		12							54
Gaviota Cahuil		12			10		7		8							37
Gaviotín Piquerito																-
Gaviota Dominicana		8			4		3									15
Huairavillo		2														2
Huairavo																-
Huala		12			8		7		13							40
Martín Pescador		1														1
Pato Anteojillo									4							4
Pato Jergón							35		10							45
Pato negro																-
Pato Real		12			10		18		18							58
Pelícano		3			2		1									6
Picurio		2							2							4
Pidén																-
Pimpollo		4														4
Queltehue		8			7											15
Run Run																-
Siete Colores		2														2
Tagua		73			510		15		21							619
Tagüita																-
Tiuque		7			6		3		4							20
Traro		2					1		2							5
Trile																-
Zarapito																-

ANEXO 2		Valores de abundancia del Cisne de cuello negro dentro y fuera del Santuario del río Cruces.		
AÑO	MES	Abundancia dentro	Abundancia fuera	Suma de abundancias
2002	N	5.030		
	D	5.328		
	E	5.664		
	F	6.044		
	M	6.280		
	A	6.364		
	M	5.795		
	J	5.391		
	J	6.047		
	A	5.941		
	S	5.598		
	O	5.171		
	N	4.935		
	D	5.458		
2003	E	5.932		
	F	6.266		
	M	6.483		
	A	7.997		
	M	7.983		
	J	6.512		
	J	5.388		
	A	3.411		
	S	3.674		
	O	2.180		
	N	2.942		
	D	2.324	1.100	3.424
2004	E	942	1.907	2.849
	F	289	2.282	2.571
	M	570	2.018	2.588
	A	866	1.219	2.085
	M	518	288	806
	J	476	303	779
	J	290	243	533
	A	249	150	399
	S	398	295	693
	O	689	229	918
	N	680	315	995
	D	668	168	836
2005	E	436	536	972
	F	1.028	562	1.590
	M	803	402	1.205
	A	819	124	943
	M	366	543	909
	J	304	625	929
	J	253	238	491
	A	401	224	625
	S	670	285	955
	O	654	466	1.120
	N	601	925	1.526
	D	372	501	873
2006	E	386	543	929
	F	252	370	622
	M	547	510	1.057
	A	616	474	1.090
	M	379	530	909
	J	383	701	1.084
	J	297	744	1.041
	A	542	426	968
	S	806	689	1.495
	O	907	501	1.408
	N	877	658	1.535
	D	251	392	643

2008	F	214	276	490
	M	360	1.398	1.758
	A	352	1.720	2.072
	M	371	1.131	1.502
	J	249	942	1.191
	J	272	714	986
	A	252	431	683
	S	869	338	1.207
	O	972	563	1.535
	N	1084	443	1.527
	D	1376	349	1.725
	2009	E	698	1326
F		613	1289	1.902
M		166	2801	2.967
A		90	4630	4.720
M		111	2882	2.993
J		158	1251	1.409
J		283	642	925
A		296	685	981
S		668	472	1.140
O		445	620	1.065
N		444	675	1.119
D		581	567	1.148
2010	E	922	380	1.302
	F	972	274	1.246
	M	637	898	1.535
	A	352	754	1.106
	M	270	608	878
	J	222	518	740
	J	568	801	1.369
	A	241	533	774
	S	326	352	678
	O	407	532	939
	N	626	145	771
	D	593	790	1.383
2011	E	668	726	1.394
	F	180	1165	1.345
	M	101	1416	1.517
	A	165	1782	1.947
	M	200	1995	2.195
	J	627	1178	1.805
	J	466	564	1.030
	A	327	353	680
	S	607	293	900
	O	730	190	920
	N	753	198	951
	D	516	223	739
2012	E	1798	241	2.039
	F	2176	336	2.512
	M	1039	854	1.893
	A	1311	1005	2.316
	M	790	1155	1.945
	J	644	850	1.494
	J	1246	473	1.719
	A	1064	166	1.230
	S	1220	293	1.513
	O	1197	114	1.311
	N	2014	100	2.114
	D	1428	196	1.624
2013	E	1699	277	1.976
	F	1519	733	2.252
	M	1833	815	2.648
	A	1430	932	2.362
	M			
	J			
	J			
	A			
	S			
	O			
	N			
	D			

<b>Anexo 3.</b>		<b>Abundancia mes a mes y Promedio anual de la especie Cisne de cuello negro.</b>											
		<b>Santuario del Río Cruces</b>											
	<b>MESES DEL AÑO</b>												<b>Promedio</b>
<b>Años</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiemb</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviemb</b>	<b>Diciemb</b>	<b>Mensual</b>
<b>2000</b>	5.093	7.998	6.923	6.867	6.943	6.313	3.438	4.897	5.010	5.002	4.532	4.623	<b>5.637</b>
<b>2001</b>	5.997	5.502	5.881	5.654	1.729	5.421	5.654	4.712	3.648	4.225	4.365	4.421	<b>4.767</b>
<b>2002</b>	5.537	6.029	6.359	6.666	6.160	6.292	5.572	5.816	5.752	4.783	5.030	5.328	<b>5.777</b>
<b>2003</b>	5.664	6.044	6.280	6.364	5.795	5.391	6.047	5.941	5.598	5.171	4.935	5.458	<b>5.724</b>
<b>2004</b>	5.932	6.266	6.483	7.997	7.983	6.512	5.388	3.411	3.674	2.180	2.942	2.324	<b>5.091</b>
<b>2005</b>	942	289	570	866	518	476	290	249	398	689	680	668	<b>553</b>
<b>2006</b>	436	1.028	803	819	366	304	253	401	670	654	601	372	<b>559</b>
<b>2007</b>	386	252	547	616	379	383	297	542	806	907	877	251	<b>520</b>
<b>2008</b>	311	214	360	352	371	249	272	252	869	972	1.084	1.376	<b>557</b>
<b>2009</b>	698	613	166	90	111	158	283	296	668	445	444	581	<b>379</b>
<b>2010</b>	922	972	637	352	270	222	568	241	326	407	626	593	<b>511</b>
<b>2011</b>	668	180	101	165	200	627	466	327	607	730	753	516	<b>445</b>
<b>2012</b>	1.798	2.176	1.039	1.311	790	644	1.246	1.064	1.220	1.197	2.014	1.428	<b>1.327</b>
<b>2013</b>	1.699	1.519	1.833	1.430									<b>1.620</b>